

Verloskundig Samenwerkings- Verband 's- Hertogenbosch e.o.

Protocol badbevallingen

Versie 3.0, december 2019

Voorlichting

Alle zwangeren die aangeven in aanmerking te willen komen voor een badbevalling, behoren voorgelicht te worden over de voor- en nadelen, zoals minder behoefte aan pijnstilling, meer patiënttevredenheid, een minimale kans op neonatale water-aspiratie en de kosten van het persoonlijke bevallingspakket.

Hiervoor is ook een folder beschikbaar.

Patiënte wordt voorgelicht over het mogelijk ontstaan van een medische indicatie met overdracht naar de 2^e lijn, waardoor een badbevalling teveel risico's met zich meebrengt. Patiënte wordt verzocht het bad te verlaten wanneer de zorgverlener dat aangeeft.

Van de partner wordt een actieve rol verwacht bij het opzetten en/of opruimen van het bad.

Vorbereiding

Hang het waarschuwbordje 'Pas op, het kan glad zijn!' aan de deur van de patiëntenkamer.

Houdt er rekening mee dat het *volledig* vullen van het bad ongeveer 45-60 minuten duurt. Tijdens en na het vullen van het bad, is het niet meer mogelijk om het bad te verplaatsen. Zorg ervoor dat je genoeg werkruimte hebt aan weerszijden van het bad.

Let op: Het bad moet tussen het bed en het raam staan, zodat het bed er in spoedsituatie gemakkelijk uit kan worden gereden!

Het bad wordt pas opgezet met de persoonlijke disposable binnenhoes en gevuld met water nadat de eigen bijdrage is voldaan. De patiënte schaft voor gebruik van het bad een persoonlijk bevallingspakket aan ter waarde van € 85,-. Dit bedrag wordt per PIN voldaan.

Hiervoor wordt het PIN-apparaat van de leverancier gebruikt (te vinden in de koffiekamer). In geval van storing van het apparaat, moet er door patiënte of partner een machtiging voor automatische incasso ingevuld en ondertekend worden. Deze machtigingsformulieren (inclusief envelop) zijn te verkrijgen via de coördinerend verpleegkundige (OVD).

Het betaalde bedrag kan niet worden geretourneerd, ook als er uiteindelijk weinig/geen gebruik van het bad wordt gemaakt.

Werkwijze PIN betaling:

PINTRANSACTIE BADBEVALLING



1 Zet het apparaat aan. houd de knop  ingedrukt.

Herhaal deze handeling voor het uitzetten van het apparaat.



2 Apparaat zoekt vervolgens naar netwerk. Het is standaard ingelogd. Wanneer het om een gebruikersnaam en wachtwoord wordt gevraagd, zie dan onderkant pinapparaat.



3 Voer het bedrag a € 85,- in op de volgende wijze:

8 5 0 0



4 Controleer het bedrag en druk vervolgens op .




5 Klant kan de betaling voldoen door contactloze betaling - pinpas op het scherm houden - of door de pas aan de onderzijde in te voeren. In beide gevallen is de pincode vereist.



6 Bij deze melding - zie scherm - is de betaling voltooid.



7 Bevestig met  voor: **geen bon.**

Wanneer de klant een factuur wenst, kan hij of zij contact opnemen met Bevallingsbaden.nl.



8 Zorg dat het apparaat altijd voldoende is opgeladen.

Stop de USB lader in de ingang aan de zijkant en stop hem in het stopcontact.

IN GEVAL VAN STORING Z.S.M. BELLEN OP 050 751 85 60 EN DE CLIENT HET AUTOMATISCHE INCASSO FORMULIER LATEN INVULLEN. HET FORMULIER KAN MET DE BIJGEOEGDE EN GEFRANKEERDE ENVELOPPE OPGESTUURD WORDEN.

Contra-indicaties poliklinische badbevalling

Tijdens de ontsluiting:	Tijdens de uitdrijving: ALLE CONTRA-INDICATIES TIJDENS DE ONTSLUITING PLUS
<ul style="list-style-type: none">• Maternale overdraagbare aandoeningen (HIV/hepatitis/herpes) of onbekende status• Gebroken vliezen zonder weeën• Diarree• Niet mobiel genoeg om zelfstandig in en uit bad te komen	<ul style="list-style-type: none">• Indicatie voor episiotomie (foetale nood/NVU)• Verhoogde kans op schouderdystocie:<ul style="list-style-type: none">- Schouderdystocie in de anamnese- BMI>35 en/of gewicht>125 kilo- Geschat foetaal gewicht >4500 gram• Fluxus in de anamnese op basis van atonie• Totaalruptuur in anamnese

Benodigheden

- Bevalbad
- Persoonlijke beschermingsmiddelen medewerker (plastic schort, spatbril bij kans op spatten)
- Voetenbankje
- Electriche opblaaspomp
- Het persoonlijke bevallingspakket met daarin:
 - Aan- en afvoerslang (10 meter)
 - Een hygiënische binnenhoes
 - Dompelpomp (voor het leegpompen na gebruik)
 - 1 set gynaecologische lange handschoenen
 - Schepnetje
 - Thermometer
 - Antislipmat
 - Duidelijke Nederlandstalige handleiding

Er zijn 2 baden beschikbaar:

- Een grotendeels opgeblazen bad hangt in de badkamer tegenover kamer 61. Van dit bad moet alleen de bovenste rand weer volledig opgeblazen worden.
- Een reservebad indien het eerste bad in gebruik is. Aan de tas zit een instructie voor het opzetten, schoonmaken, leeg laten lopen en opruimen.

Alle materialen (met uitzondering van het bad en het voetenbankje) zijn te vinden in de linnenkast tegenover kamer 51.

Werkwijze opzetten en opruimen

Opzetten:

- Zorg voor een schone ondergrond.

- Open het persoonlijke bevallingspakket.
- Vouw het bevallingsbad uit. Het opgeblazen bad kan voorzichtig rollend worden verplaatst.
- Blaas het zitje en de bodem op met de elektrische opblaaspomp.
- Blaas ook de onderste 2 randen op en de bovenste rand voor de helft.
- Plaats de hygiënische binnenhoes in het bad en over de bovenste rand.
- Blaas de bovenste rand verder vol, zodat de hoes mooi strak in het bad zit.
- Vul het bad met warm water door de waterslang te koppelen aan de douchekraan.



- Draai daarna de knop linksom om de waterstroom naar de vulslang te openen



- Het volledig vullen duurt 45-60 minuten.
- De ideale temperatuur is 36-37 graden Celsius en staat aangegeven op de thermometer. Met de afdekhoes verlies je slechts 0,5 graden per uur.

Opruimen:

- Sluit de waterslang aan op de dompelpomp. Hang het andere uiteinde onder de bril door in de wc, zet hem aan, dompel de pomp onder water en leeg het bad.
- Laat de bovenste rand leeglopen en leg alle gebruikte spullen (thermometer, waterslang, schepnetje) op de bodem van het bad.
- Verwijder de binnenhoes van de bovenste rand en vouw deze als een grote zak naar elkaar toe. Gooi de hoes met daarin alle gebruikte spullen bij het afval.
- Reinig het bad indien nodig direct met Incidin OxyFoam.

- Bij gebruik van het reservebad: laat de rest van het bad leeglopen en haal de overige lucht eruit met de elektrische opblaaspomp. Vouw het (droge) bad weer op en doe deze terug in de tas.

Zie voor opzetten en opruimen van het bad ook op de website van de leverancier, www.bevallingsbaden.nl.

Werkwijze tijdens de bevalling

Het dragen van lange handschoenen, een spatschort en spatbril wordt geadviseerd.

Ontsluiting

- Controleer maternale temperatuur en foetale cortonen, voordat zij in het water gaat.
- Controleer maternale temperatuur regelmatig.
- Maak het water warm maar niet heet. 36,5-37,5°C is ideaal. Meet en noteer ieder uur de watertemperatuur. Kouder water (<36°C) vergroot de kans op eerder inademen van de baby. Hoger dan 38°C vergroot de kans op maternale koorts en foetale tachycardie.
- Geen zeep/douchegel gebruiken in bad.
- Adviseer zwangeren te blijven drinken (vochtverlies hoger door warme omgeving) en te blijven bewegen.
- Zo nodig kan het badwater verversd of aangevuld worden.
- Ontlasting en bloedstolsels moeten zo snel mogelijk verwijderd worden uit het water. Indien het niet mogelijk is om het badwater schoon te krijgen is het verstandig de moeder te vragen tijdelijk het bad te verlaten en kan het water vervangen en het bad schoongemaakt te worden.

Werkwijze uitdrijving

- De geboorte van de baby dient volledig onder water te gebeuren, omdat contact met lucht de baby kan stimuleren tot ademhalen en kan leiden tot wateraspiratie. De baby wordt na de geboorte rustig door moeder of verloskundige boven water gebracht (duur maximaal 30 seconden). Als de baby door het veranderen van houding tijdens de geboorte met lucht in aanraking komt dient de bevalling boven water te worden afgerond. Dit kan door de moeder te laten staan in bad.
- De 1^e Apgarscore wordt op de gebruikelijke manier en tijdstip bepaald.

Werkwijze postpartum

- Voorkom afkoelen van de baby. Overweeg gebruik van celstof matjes om de baby warm te houden (natte handdoeken koelen af).
- Afnavelen in bad is mogelijk.
- Het nageboortetijdperk dient op de gebruikelijke wijze te worden begeleid. Syntocinon kan zo nodig onder water toegediend worden, of in de bovenarm van de moeder.